Занятие 2. Основы статистики: повторение

20 января 2021

Статистическая гипотеза — предположение о генеральном параметре, тестируемое на основе данных. Нулевая гипотеза тестируется против альтернативы.

Статистическая гипотеза — предположение о генеральном параметре, тестируемое на основе данных. Нулевая гипотеза тестируется против альтернативы.

Примеры нулевых гипотез

- E(X) = 5
- ullet Подбросим монетку. P(орел) = P(решка) = 0.5

Примеры альтернатив

- E(X) = 3; E(X) > 5; E(X) < 5; $E(X) \neq 5$
- ullet $P(\text{opeл}) = 0.7; \ P(\text{opeл}) > P(\text{peшкa}); \ P(\text{opeл}) < P(\text{peшкa}); \ P(\text{opeл})
 eq P(\text{peшкa})$

Напоминания

• Статистическая гипотеза формулируется о ГЕНЕРАЛЬНОМ ПАРАМЕТРЕ, а не о его оценке.

Напоминания

- Статистическая гипотеза формулируется о ГЕНЕРАЛЬНОМ ПАРАМЕТРЕ, а не о его оценке.
- Чаще всего используются двусторонние альтернативы. Если Вы все же решили воспользоваться односторонней альтернативой, предварительно посмотрите на оценки необходимых параметров. К примеру, если проверяете гипотезу о равенстве средних, сравните средние в двух выборках, чтобы правильно определиться с лево- или правосторонней альтернативой.


Далее мы формулируем статистику критерия. Что это такое и зачем она нужна?

Далее мы формулируем статистику критерия. Что это такое и зачем она нужна?

Ответ

Статистика критерия – функция от выборки, используемая для принятия решения относительно отвержения / неотвержения нулевой гипотезы. К примеру, можно рассмотреть количество выпавших орлов / решек для тестирования, правильная ли монетка.

Далее мы считаем p-value, или минимальный уровень значимости. Ниже – распределение статистики в условиях верной нулевой гипотезы (H_0) .



A p-value (shaded green area) is the probability of an observed (or more extreme) result assuming that the null hypothesis is true.

В заключении делаем вывод о H_0 .

• Если p-value мало, значит наблюдаемое значение статистики ближе к хвостам распределения («экстремальным» значениям), следовательно, на основании имеющихся данных мы отвергаем нулевую гипотезу в пользу альтернативы.

В заключении делаем вывод о H_0 .

- Если p-value мало, значит наблюдаемое значение статистики ближе к хвостам распределения («экстремальным» значениям), следовательно, на основании имеющихся данных мы отвергаем нулевую гипотезу в пользу альтернативы.
- И наоборот, если p-value достаточно велико, значит наблюдаемое значение статистики ближе к центру распределения (характерным значениям), следовательно, на основании имеющихся данных мы не можем отвергать нулевую гипотезу в пользу альтернативы.

Тестирование гипотез: practice makes perfect



Тестирование гипотез: practice makes perfect



Задача

Подросим монетку 10 раз. В результате выпало 8 решек и 2 орла. Протестируйте нулевую гипотезу о том, что монета правильная, против альтернативы P(решка) > P(орел) на основании p-value.



Вопрос

Что дает оценивание регрессии по сравнению с корреляцией?

Вопрос

Что дает оценивание регрессии по сравнению с корреляцией?

Ответ

Корреляция	Регрессионная модель
Сила связи	Эффект изменения Х
между Х и Ү	на Ү (предсказание Ү по Х)
Линейная взаимосвязь	Можем моделировать
	нелинейность *
Нет зависимой и	Выбор отклика
независимой переменных	имеет значение

^{*} N.В.: модели линейные с точки зрения коэффициентов, но при этом могут учитывать нелинейную связь X и Y

Вопрос

Запишите спецификацию линейной регрессии в общем виде.

Вопрос

Запишите спецификацию линейной регрессии в общем виде.

Ответ

```
y_i = b_0 + b_1 x_{1i} \dots + b_k x_{ki} + e_i, где y_i — зависимая переменная (отклик), b_0 — константа (intercept), b_1, \dots, b_k — коэффициенты при предикторах, x_i — независимая переменная (предиктор), e_i — ошибка.
```

Вопрос

Запишите спецификацию линейной регрессии в общем виде.

Ответ

$$y_i = b_0 + b_1 x_{1i} ... + b_k x_{ki} + e_i$$
, где y_i – зависимая переменная (отклик), b_0 – константа (intercept), $b_1, ..., b_k$ – коэффициенты при предикторах, x_i – независимая переменная (предиктор),

 e_i – ошибка.

$$\hat{y}_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_{1i} ... + \hat{b}_k x_{ki}$$
 – это предсказанное значение зависимой переменной;

 $\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i$, где \hat{e}_i – это остаток (оценка ошибки).

Вопрос

Метод наименьших квадратов (МНК) — один из методов оценивания параметров в регрессии. Объясните основной принцип этого метода.

Вопрос

Метод наименьших квадратов (МНК) – один из методов оценивания параметров в регрессии. Объясните основной принцип этого метода.

Ответ

В соответствии с МНК выбираем такие оценки коэффициентов, при которых линия предсказания наиболее близка к наблюдениям. Математически происходит минимизация суммы квадратов остатков:

$$\min \sum_{i=1}^{n} (y_i - (\hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_{1i} \dots + \hat{b}_k x_{ki}))^2$$

Вопрос

Метод наименьших квадратов (МНК) – один из методов оценивания параметров в регрессии. Объясните основной принцип этого метода.


Ответ

В соответствии с МНК выбираем такие оценки коэффициентов, при которых линия предсказания наиболее близка к наблюдениям. Математически происходит минимизация суммы квадратов остатков:


$$\min \sum_{i=1}^{n} (y_i - (\hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_{1i}... + \hat{b}_k x_{ki}))^2$$

Или можем переписать это в таком виде: min $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$

Иллюстрация принципа МНК



Интерпретация оценок коэффициентов



 \hat{b}_0 (также обозначается как a) — среднее значение отклика при условии равенства предикторов 0.

 \hat{b}_1 – на сколько в среднем изменяется отклик при увеличении предиктора на единицу измерения при прочих равных.

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

Допущения

• Корректная спецификация регрессионной модели

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

- Корректная спецификация регрессионной модели
- Нет строгой мультиколлинеарности
- $\bullet \ E(e_i|x_i) = 0$

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

- Корректная спецификация регрессионной модели
- Нет строгой мультиколлинеарности
- $\bullet \ E(e_i|x_i) = 0$
- $Var(e_i|x_i) = const$ (гомоскедастичность)

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

- Корректная спецификация регрессионной модели
- Нет строгой мультиколлинеарности
- $\bullet \ E(e_i|x_i) = 0$
- $Var(e_i|x_i) = const$ (гомоскедастичность)
- $Cov(e_i, e_j) = 0$ (отсутствие автокорреляции)

Вопрос

Каким требованиям должны соответствовать ошибки в регрессии для получения несмещенных и наиболее эффективных оценок среди класса линейных оценок (BLUE)?

- Корректная спецификация регрессионной модели
- Нет строгой мультиколлинеарности
- $\bullet \ E(e_i|x_i) = 0$
- $Var(e_i|x_i) = const$ (гомоскедастичность)
- $Cov(e_i, e_j) = 0$ (отсутствие автокорреляции)
- $Cov(e_i, x_i) = 0$ (экзогенность)

Ссылки

Источники картинок:

- https://examvictor.com/probability-basic-concepts/
- https://www.econometrics-with-r.org/
- https://elliptigon.com/statistical-significance-and-inference/
- $\bullet \ https://bookdown.org/sbikienga/Intro_to_stat_book/$